





12  
26  
h  
10

V. N. K. A. M.

CHINA

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910



TABVLAE  
VNIVERSAM  
CHIRVRGIAM MIRO  
ORDINE COMPLECTENTES.  
EX ERVDITIORIBVS  
MEDICIS COLLECTÆ.

PER HORATIVM MORVM  
Medicum Florentinum.

*CVM PRIVILEGIO.*



VENETIIS,  
Apud Giordanum Zilettum, & socios,  
M. D. LXXII.

UNIVERSAM  
 CHURCHIAM MIRO  
 ORDINE COMPLENTES  
 A. 1711. 1712.  
 27. 28. 29. 30. 31.

PER HONORATISSIMUM MORAM  
 M. D. C. C. C. C. C.

CL. 1711. 1712.



V. E. T. I. S.  
 A. 1711. 1712.  
 M. D. C. C. C. C.

EXCELLENTI ARTIVM;  
AC MEDICINAE DOCTORI  
HIERONYMO CONFORTO,



*Horatius Morus. S. P. D.*



VM mecum memoria repeterem, vir præstantissime Hieronymus Conforte, aureum illud Censuræ Catonis didendum; quo dicere consueverat, otij, ac negotij nobis reddendam esse rationem, indignum sanè libero homine existimabam, si velut in tenebris delitescens, nullam meam rationem redderem, ac viuis, vidensque (vt elegantissime Lucretius ait) vitam ipsam perderem. Quare hanc compendiosam de chyrurgia artem simul inertis otij euitandi gratia, simul vt communi studioforum iuuenum vtilitati aliqua in parte prodessem, mihi scribendam censiui: quam quidem tibi vir præstantissime dicatam volui, cum vtineas erga te obseruantiae pignus existeret (Sciò enim quantum tibi pro tua in mesingulari humanitate debeat) tum vt ipsa haberet, sub cuius nomine, ac patrocinio in lucem tota prodiret. Omnia enim (vt tu optime nosti) utilitigatoribus plena sunt, nihilque tam sincerum, tam egregie limatum est; quod virulentas Homeromasticum linguas effugere possit. Quod si te fauctorem, ac patronum habuerit, nihil erit, quod has larvas, aut Zoiolos pertimescat. Is enim es tu, qui ob ingenij tui præstantiam, multiugam eruditionem, elatam facundiam, ac morum integritatem, cæterasque eximias animi tui dotes, omnibus æque charus, ac gratus sis, atque olim Cois ciuibus Hippocrates. Et vt paucis multa concludam, Hieronymus Confortus es. Accipe igitur vir excellentissime nostrum hoc quantulumcunque vel leuidensè munus, & vt omnia soles, tuo benigno fauore prosequere. nam si hoc gratum tibi fuisse perspexero; ad maiora in dies sub tuis felicissimis auspicijs animus accendetur meus. Vale, o decus meum. Datum Vrceis nouis, III Idus Ianuarias M D L X I X.

# MADLECTOREME HOCANDIDIMMA

OTROZAPROTO



**P**lutarchus & Ocheroneus (Lector candidissime) vir doctissi-  
mus, prudentissimus, cuius vel sola monumenta ingenij  
ad plebey hominem doctum efficere possent, vitam a Deo  
nomini datam ad cognitionem existimas, nam cognitio non  
solum gloriam parit, sed & virtutes in actum producit, quod  
quidem esse verissimum re ipsa facillime videmus. Nam  
ut excellentissimorum virorum nocturna, diurna vigilia? unde tot ex  
vniuersi labores? nisi ut ad rerum cognitionem peruenirent? atq; ea qua tum  
ex seipsis meditando, tum ex aliorum monumentis legendo cognouissent, in me-  
diu producerent? Horum ego (licet omnium minimus) imitatus exempla,  
cum Dei Opt. Max. benignitate aliquantulum cognitionis in arte medica mi-  
hi comparauerim, id (quantuluncunque est) haud mihi soli, sed & aliorum uti-  
litati comparatum volui. Neq; enim (ut diuinus ille Plato ad Architam suu  
scripsit) nobis solum nati sumus, sed ortus nostri partem patria sibi vendicat,  
partem amici. Cum igitur has chirurgicas tabulas ex Ioanne Tagaultio om-  
nium aetatis sua perinissuno scopellianis vigilijs elucubratis eo ordine compilaue-  
rim, ut vno intuitu singula facile uideri, ac comprehendi possint, eas ad studio-  
rum iuuenum utilitatem in lucem edendas curavi. Scio quidem fore nonnul-  
los, qui nostrum hunc officiosum laborem stoccipendant, ac subsannent, rubigi-  
nosq; dente rodant, at tu optime lector hac (qualiacunque sunt) non illis, sed ti-  
bi scripta existimes uelim. Tu igitur bilari animo accipe, ac iure tuo frue-  
re. Vale.



# Tumorum præter naturam.

5

Tumor est præter naturam, incrementum, naturalem statum in corpore excedens, & lesionem actionis inducens: cuius differentie 3. Mech. Sumuntur, Vel 2.

Defluxu humoris

Calidi, ut

Sanguinis

Naturalis: qui est calidus & humidus, & ad corporis nutritionem idoneus.  
Qui 3. Mech. si peccat quâtiue generat Phlegmonem, ueram, cuius causâ

Materialis: i. subiectiva: Quælibet est corporis pars exterior  
Formalis { Dolor  
Tensio  
Calor  
Rubor  
Pulsatio

Externa

Contusio  
Disruptio  
Convulsio  
Fractura  
Vulnus  
Luxatio & eiusmodi doloris exclusio  
Optimi sanguinis abundantia  
Experamentum  
Necrosis  
Victus ratio  
Grauitas  
Vici

Efficiens

Interna, ut

calida & humida

Non naturalis require hoc signum. 7

Bilis: Vide in sequenti signo 3

Frigidi: Vide signum. 2

Congestione: cuius causæ efficiêtes sunt

Error virtutis Altricis  
Imbecillitas Expultricis  
Obstructio

Tumores hac via potius frigidi generantur quam calidi.

A 3

Curatio, in qua considerandum quid sit agendum, indicat morbi causam efficiens, quae suae ablationem pulsant. Idque

Optima uictus ratione secundum debitam

Qualitatem } hanc ad Physicum spectant.  
Quantitatem }

Auersione: quae sit sanguinis missione a parte opposita secundum re-  
ctum, frictionibus, balneis, ligaturis, scarificationibus, &  
eiufmodi.

Repercussione: ut pos. 4. 13. Meth. aqua frigida, & vino austero; aut  
cataplasmate Galeni. 2. ad Glauconem, ab Auicenna sen. 3. lib. 4.  
Trac. 1. cap. 3. descriptam quod R. succi semperuui librâ una,  
uini R. allz substantia & saporis acerbi librâ lemis, farina hor-  
dei quantum unum, corticis malorum granatorum, & sumach  
puluerizatorum annâ uuc. s. coquantur & fiat linimentum;  
& alij refrigerantibus & adstringentibus; idque in principio  
morbis: Quod est cum particula incipit distendi, & fluxionis  
adest initium cum exiguo dolore: Et nisi sit in emunctorijs Tu-  
mor, aut per crism excitatus, aut a materia venenosa progeni-  
tus: in his. a. tribus casibus repercutiua haud conueniunt.

In augmento uero. i. quando Tumor attollitur, & symptoma-  
ta augentur ipsis repellentibus nonnihil discutientium admi-  
scendum; quale est rosaceum Galeno. 3. Simpli. medi. facul.  
At in statu; quando praedicta omnia suum uigorem obtinent,  
nec amplius possunt augeri, nisi in aliam formam humor tran-  
smutetur, & quis portionibus miscenda sunt reprimenda discu-  
tientibus: In quo casu ualet Galeni emplastrum. 13. Meth.  
quod R. medullae panis frumenti in aqua calida macerata, &  
expressa lib. j. mellis optimi un. iij. miscetur & fiat emplastrum.

Euauctione puris resoluentibus in declinatione, & si apostema re-  
soluitur. Quod cognoscitur membri leuitate, & deciente pul-  
satione; Qualia sunt lana succida, aut spongia, siue stuppa ui-  
no calente imbuta postea expressa, & applicata; aut hordii fa-  
rina cum melle adhibita, & eiufmodi.

Maturatione: si apostema tendit in putredinem, quod indicant, do-  
lor intrinsecus, pulsatio, & caloris incrementum. Igitur ap-  
plicandum emplastrum quod conficitur ex farina frumenti aqua  
& olio. 2. ad Glau. aut simile.

Apertione: si suppuratio est facta; quae his uerbis dignoscitur:  
Duritiae longa, dolor, & calor aucti

Signant pus fieri: sed factum dicta remissa

Sub digitis undans, albescens pars & acuta.

Quae apertio fieri debet ferro, aut medicamento adurente eo  
loco quo materia continetur, in loco inferiori, secundum ru-  
gas, & processus musculorum; et nerui uenae et arteriae quoad  
fieri potest uitandae sunt; Nec sanies tota semel euacuanda: Ac  
demum dolore quam fieri potest minimo locus tractandus, fa-  
cta apertione locus ut reliqua ulcera curari possat.

Doloris sedatione, ex passo oleo rosaceo et pauca cera  
Galeno laua succida excepto, estate frigidum, hyeme ue-  
ro tepidum, aut maluis coctis mixtisq; hursure et rosaceo.

Quod si dolor acerbissimus sit, hyosciami folia sub cin-  
eribus cocta, & axungi graeceti permixta applicari possunt.

Recurfus humoris ad interiora, in quo casu trahentibus me-  
dicamentis, atque cucurbitulis utendum est.

Duritie relictae propter exiccantia medicamenta inconsul-  
to adhibita, cui succurrimus ex Galeno radicibus cucu-  
meris asinini, aut brioniae, aut asari in aqua coctis, aut  
etiam caricas pingues sibi adiicimus, deinde farinam cum  
aqua admiscemus, cui aliquid adipis anatis, uel suilli ad-  
iungimus, & cataplasma conficimus.

Putretationis, eam partem protinus excindere oportet,  
aut scarificationibus profundis incidere, atque ea opera-  
ri, quae de Gangrena paulo infra describimus.

Quantitate: Quae mor-  
bi uehementia, & tate,  
anni tempore & mor-  
bi aetate, uel minu-  
da est.

Fluen-  
tis, iur

Quali-  
tate co-  
trariam  
humo-  
ris

Medica-  
mentis  
seculis

Fluxi  
ut

Accide-  
ntiu cor-  
rectione  
ut


# Tumorum præter naturam.

7

Tenuior, & generatur Erysipelas; sapit. n. bilis naturam, cuius causas & curationem inferius suo loco adnotabimus.



Non natura  
lis quia ob  
sua corrup  
tionem ine  
ptus est ad  
corporis  
nutritio  
nem, & consi  
deratur, vel



Ex simplicium  
tumorū notio  
& curatione  
facili implexo  
rū notio & cura  
tio innotescit.

L. 1.

Curatio, in qua confidendum quid sit agendum, indicat morbi causa efficiens, quæ sui ablatione requiritur; fit

Curatio in qua confidendum

Ad id quod intendit chirurgus possit perficere nec ne, indicat morbi sequitia & membrum affectum. Nā

Optima victus ratione

vniuersali ut

Euariatio

Particulari ut

Optima victus ratione, quæ ad Phyticum pertinet

Medicamentis ut

Sanguinis missione } ad physicum attinent.  
Pharmacis

Profunda scarificatione

Aquæ salis abluione

Medicamentorum putridis consecratorum admotione, quale est, quod ex farina orobi, aut lolij, aut fabæ ex oximelle uel syrupo aceto conficitur.

Nec inutile fuerit qualibet die locum scarificatum aceto calente uel mulso lauare; & ubi serior subsederit, unguento egyptiaco utendum. Quod si malum increuerit, aliquem ex Trociscis Andronis, Polydæ, uel Musæ, aut Passionis exquisitissimè tritum, & aceto & uino dilutum, aut arsenicum præ omnibus ualens admoemus. Sed cōsideranda consilio Galeni 2. ad Glau. quando hæc applicantur ægrotant, & partis affectæ natura, quando uno remedio non omnes curentur. Quibus remedijs si malum non cedit, membrum quod putrefcit abscindere oportet; postea ferro candenti pars sana adurenda, & porri succo cum sale (Paulo autore) illuenda. Vbi uero putredo se remiserit, quæ crustam resoluunt adhibenda, ut est butrum, aut ali-quod simile unctuosum. Porro resoluta crusta aceto pars abluenda, & supra emplastrum quod s. mellis lib.s. Vitellos ouorū iij. farinae hordei unc. vj. miscantur & fiat emplastrum, cui post biduum apponi debet mirræ drac. x. ut melius ulcus mundificetur. Quousque peractus quæ carionem producant, & cicatricem inducant admoenda erunt.

Venerit si cuone secundum rectum ad animi deliquium 14. Meth. & 2. ad Glau. nullo alio impediēte, scarificationibus profundis, ab his ventosæ, aut hiruīnes applicandæ ueniunt, postea aqua salis locus affectus abluatur, deinde emplastrum Galeni quod s. plantaginis maris, lenium, panis furnacei ann. par. equaliter. Quibus & gallas adiecti Auicennæ, decoctis in aqua admoventur. Aut illud quod ex duobus pomis granatis in aceto coctis conficitur. Cæterum optimum erit circumiacentes partes unguento ex bolo armenia, rosaceo & aceto parato superinducere. Quod si carbo nobis inducias dederit, maturatur, & aperitur Auicennæ emplastro siccibus, frumento, & sale simul mixtis, aut illo Theodorici quod componitur ex vitellis ouorum & sale, aut illo quod s. mellis, salis, farinae frumētæ, & ouorum luteorum simul mixtis, postea mundificatio ex appo deurgendus. Carboni porro crustam habenti, ualidè ex cātia applicanda sunt. ueluti est Galeni cataplasma ex orobi farina & oximelle compositum.

Carboni autem cum maligno ulcere complicato, ualeat egyptiacum, radix dracunculi, & aristolochie ex aceto trita & unposita, calis, assenicum, & sandaracha; inter ferro ignito utendum, cum extremis morbis extrema remedia adhibenda sint, finis adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris adest. Post hæc crusta resoluenda; & absumpto carbuntulo detergeniibus, postea carne implentibus utendum, de quibus tabula de uulneribus & ulceribus est scriptum.

Omnis carbo ex se est periculosus

Quod si accidentia semper incrementant, aut sit (ex Auicenna) in emunctorijs propè membra principalia, aut circa stomachum & gulam (Cello autore) periculosissimi censetur, sic si nigricat, aut liuescit neminem non iugulat. econtra contrarium iudicatur.

Materialis: i. subiectina, cutis est exterior, sed maxime faciei si Paulo adhibenda est fides, licet tunc bili sanguinis aliquis portio sit admixta; ideo Paulus præcipit ex humeraria vena sanguinem evacuare.

Naturalis, quæ est humor calidus & siccus, ex tenuiore parte chyli generatus; q. si peccat qualitate, producit q. ad Glau. Erysipela exquisitæ cuius causa

Formalis {  
Tumor } minor quàm in Phlegmone  
Dolor }  
Calor vehemens febrem excitans  
Color rubeus ad flauum uergens, sed tactui subterfugit rursusque illabitur.

Efficiens {  
Externæ } Frictiones  
Motus uiolenti  
Insolatio  
Medicamentorum calidorum admotio & eiusmodi  
Internæ } Bili seu subitioris caloris sanguinis feruidior  
Temperamentum  
Aetas  
Victus ratio } Biliofa

♂ Bili

In leuiss.

Quia bili naturalis per putredinem aduritur

Tenuer

Herpes miliaris, licet teste Oribasio aliquid pituitæ bili sit admixtum; sub his ponuntur Variolæ, & Morbilli 3. Epidemiarum

Quæ si sunt

Mediocra

Produ-cunt

Herpes excedens Galeno 14. Meth.

Quia vitæ lina nō naturalis per adustionē inuenis, he paræ, & vitritulo fiat porracea, eruginosa uel prasina

Crassæ

Phagedenæ .i. lupus & exulcerati canceri, de quibus uide inferius, cap. de cancro

Nō naturalis, idque uel

Æqualiter, & æqualis gignit affectus

Ratione alterius humoris sibi permixti; idque

Inæqualiter, ut si bili sit admixta minor portio.

Sanguinis }  
Fictitæ }  
Mêlæcolicæ }

& generatur

Erysipelas Phlegmonosum  
Erysipelas Oedematosum  
Erysipelas Schytolum

Quid sit agendum in dicat morbi causa efficiens, quæ sui ablatio non requirit	Optima uictus ratio in sex rebus non naturalibus, secundum Medicamento bilem euacuante si morbus est magnus si uero paruus clystere tantum, ut Galeno placuit	Qualitatem Quantitatem hæc physici sunt.
Curatio in qua considerandum	Localibus remedijs secundum quod locum quorundam humoris	<p>Fluentis: infrigidantibus &amp; reprimentibus, qualia sunt Galeno solani succus, semperuius, porrethæ, piliij, hyoscyami, lactuca, &amp; eiusmodi; aut vnguentum album Galeni, cui si accipi paululum adiecoris præstantius erit, &amp; utiq; frigida semper sunt applicanda, &amp; liquida; &amp; sæpius amouenda priusquam manite sit dulcescant, aut arefiant. Quibus misceri potest (necessitate urgente) opij aliquid, aut cicuta, aut mandragoræ. Terminus applicandorum remediiorum est coloris partis mutatio. 14. Meth.</p> <p>Fluxi: Vbi color fuerit mutatus, resoluentia adhibenda sunt, quale est quod &amp; foliorum altheæ lib. j. quæ decoquantur in aqua ad contusum addatur olei rosacei unc. iij. argenti spumæ, ceruse an. 3. f. a. iterum leuigantur cum succo solani, aut semperuius, &amp; micis panis adiungis &amp; conficitur emplastrum &amp; apponitur.</p> <p>Quod si forte linor apparuerit, cutis scarificetur, &amp; superappondatur cataplasma ex hordeacea farina, &amp; pluries aqua calida, aliquando muria (materia exsistente crassa) locus lauetur, ut materii crassa foras extrahatur.</p> <p>Accidentij Doloris Ardoris</p> <p>Eiusdem remedijs supra in curatione Phlegmonis citatis utendum; sicq; faciendum, si materia ad interiora repat.</p> <p>Quod si erisipelas exulceretur, adhibeatur vnguentum album, de litargiro, quibus si addatur aliquid recementi plumbi efficacissimum erit remedium.</p>
An id quod intendit chyrurgus possit perficere necne, indicam subsequentes aphorismi	An id quod intendit chyrurgus possit perficere necne, indicam subsequentes aphorismi	<p>Erisipelas 6. aph. 25. ab exterioribus uertit ad interiora, malum.</p> <p>In oïsis denudatione 7. aph. 19. Erisipelas malum</p> <p>Mulieri grauidæ 5. aph. 43. si in uero superueniat erisipelas, mortale</p> <p>Ab erisipelate. 5. aph. 44. putredo malum.</p> <p>Erisipelata quæ capiti superueniunt periculosa esse solent, Paulo auctore</p>
Horæ causa	Materialis. i. subiectio, cutis in Herpete exedenti Formalis Efficiens	<p>Optima uictus ratione sed hæc physici Medicamentis purgantibus. licet sunt. Postea reprimentibus. Nam 14. Meth. reprimentia adhibenda non sunt corpori repleto humoribus repleto. Quæ reprimentia debent esse frigida &amp; sicca, ut sunt uitis capreoli, folia rubi, &amp; cani rubi, &amp; phlogaginis maris; post hæc uero &amp; lenticulam adiungere oportet, &amp; aliquando mel, &amp; farinam hordeaceam. Idque faciendum materia adhuc fluente</p> <p>Materia iam fluxa digerentibus utendum ut cataplasmate ex corticibus mali punici uino decoctis; &amp; sumac &amp; hordei farina composito. Post hæc ex canticibus non ualde asperis utendum, ut uulnus ad cicatricem perducat. Quorum silua extat apud graues auctores; ideo illic recurrendum, quando hic breuiati studeamus.</p>

# Tumorum præter naturam.

II

D. Frigid, ut	Pituita	Naturalis, quæ est frigida, & humida, substantia cruda, colore uergens ad quendam albedinem: quæ si peccat quantitate producit Oedema, cuius causa	Materialis. i. subiectiua: quælibet est corporis pars exterior	Formalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumor laxus, si q præmat digitis uestigiū reliquit</li> <li>Color albus</li> <li>Doloris expers</li> </ul>	Efficiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humor pituitosus naturalis</li> <li>Temperamentum</li> <li>Aetas</li> <li>Viæ ratio</li> </ul>	frigida & humida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Non naturalis, vel	In se, quia eo uertitur in substantiam	Aquo sam	Aquosū sub quo phlegmonæ, cuius causa	Materia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corpus uniuersum ut in ascite &amp; sym. causis</li> <li>Caput</li> <li>Scrotum</li> <li>Testiculi</li> <li>Pedes</li> <li>Iuncturæ</li> </ul>	Formalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumor laxus &amp; splendens eū ad lucem inuener</li> </ul>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									Et producit tumorem	Efficiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reliqua oedematis signa</li> <li>Imbecillitas calidi innati</li> <li>Serosus humor pituitosus</li> <li>Temperamentum</li> <li>Aetas</li> <li>Viæ ratio</li> </ul>	humida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Melancholiz: vide sequens signum. In.

Curatur causæ effi- cientis ab- solutiõe, idq; con- sequimur	Medi- camen- tis secũ- dum de- bitam qualita- tẽ con- trariam humo- ris	Optima victus ratione in sex rebus non naturalibus se- cundum debitam	Fluctis vt	Præparatiõe oximellite aliquo, & euacuatiõe p phlegmagoga	Qualitatem Quantitatem	Hæc ad physi- cum pertinent.
		Repercussione siccantibus & digerentibus; Quæ variantur iuxta morbi tempora, vt in principio spongiam nouam, uel aliam lixiuio ablutam, in posca (ut bibi possit) imbutam, & ligatam, ab inferiori parte incipiens arctius, & supra definens remissius, ut 14. Meth. & secundo ad Glau. bonum est. Quod si huic reme- dio acetum amplius, uel modicum aluminis (posca non pro- ficiẽte) addideris, remedium incrementi tempore ualde con- ueniens effeceris		Fluxi vt	Euacuatiõe, puris resoluentibus in statu & declinatione admo- tis, vt est sponsia noua in lixiuio imbuta ex cinere fici, vitis, & quercus præparato; & applicata	In adenate inueterato secundo ad Glau. Galenus utebatur olei unctiõe, & spongiam lixiuio plenam arctius superligabat. Maturatiõe. Si cœdema tendit in putredinem, vnguentum è suc- cis Diachylon, præcipuè illud Rogerij maxime confert. Aperitiõe ferro candenti, aut medicamẽto caustico. Deinde sor- des vnguentu apostolorum, uel mundificatiuo ex apio & ab- sinthij succo detergetur.
Accidentium correctio ne vt	Doloris. Quod sedat æsopio humida, uel uino cocto, aut cœrato ex oleo camomil- lino, de absinthio, spica. & cera pparato Duritici: emollitur, & resoluitur medu- la bubula aut certuina, aut alia simili					
Curatio causæ effi- cientis a- motive perficit, adque	Optima victus ratione Calidi innati restauratione Serosi humoris per aluum & urinas euacuatiõe	Quæ omnia ad Medicũ attinẽt.				
			Serosi humoris in parte affecta euacuatiõe & exiccatione, ut oxi rhodino & sale. 14 Meth. & ad Glauconem. Spongia noua lixiuio imbuta, cui sit admixtum alumẽ sul- fur & nitrum. Aut hoc emplastro Auicennæ quod & seminum sinapis, seminum urti- cæ, sulfuris, spumæ maris, aristolochiæ rotundæ, bdelij an. unc. j. ammoniaci, olei an- tiqui, ceræ an. unc. ij. Quod si hoc emplastro, curari non potest, incisione cum ferro utendum, deinde detergendum, & aliorum sordidorum ulcerum more, curandum.			



2. Flatuo- sum cuius causa	Materia- lis. i. sub- iectiua	Membrana, quæ circumdat musculos, uiscera aut ossa. Ventriculum Intestina ut in colicis Peritoneum ut in tympanite
	Formalis	Tumor tactui renitens, & sonum reddit ut tympanum quando per- cutitur. Splendet. Dolor adest rentius
	Efficiens	Externa ut contusio Interna ut { Imbecillitas caloris natui 6. de morborū & symp. causis Meatus densitas ex Auicenna Materia humida

2.	Horū oīum causa	Forma- lis	Nodi, seu dubelete Auicennæ Glandulæ, ganglia, seu lupia Broncocele. i. botiū, seu hernia gutturis Scrofulæ. i. strumæ, seu cherades Fugile Auicennæ. i. bubo Guidonis. i. pa- roidæ Steatomata, sub quibus napa, in quibus ueluti adeps reperitur Atheromata, quæ in se continent quid pulti simile Melicerides, sub quibus testudo, & tal- pa, quæ in se continent humorem sub stantiam mellis referentem.
			Materialis quælibet serè corporis pars exterior licet quorundam sit pars propria, ut ex eorum natura uidere licet.  Tumores concolores Renitentes tactui Indolentes Mobiles qui cystim habent. Immobiles qui cystim non habent.  Efficiens pituita crassa, quæ si diutius in parte affecta aliquando maneat, in uarias formas mutatur, etenim lapides, arenæ, ligna, carbones, amurca & eiusmodi in abscessibus inueniuntur.

Hic ob chartæ penuriam curatio particularis steatomatis Atheroma-  
tis, & Meliceridis in schemate adnotatur



Verum animaduerte ne cystis illa incidendo disrumpatur, aut exedendo  
portio aliqua relinquatur.

Optima uicinus ratione, qua calor natiuus restauratur, & uirtus concoctrix roboratur. quæ ad physicum pertinet.

Vaporum extenuatione

Mearum apertione

Curatur  
causæ effi-  
cietis abo-  
litione: vt

Hæc medicamentis extenuantibus, & calefacientibus perficitur, & alterantur prout magis uel minus sunt crassi & densi. Horum remedium materia apud Galenum 24. Meth. reperitur. Vbi in artibus tumore flatuoso sine dolore existente spongiam lixiui imbutam adhibet. Dolore præsentē antequam spongiam applicet oleo aliquo discutiente partem affectam inungit. Porro si ex contusione tumor flatuosus nascatur, in principio ipse utitur sapo, uino, exiguo aceto & oleo simul mixtis, oleum & uinum addens & minuens, pro doloris ratione. Nam maximo existente dolore, uinum & oleum maiori portione addit; in minori uero dolore, minuit. Transacto principio, & cessante dolore lixiuium & acetum loco uini medicamento imponit. Ceterum, si flatuosus tumor fuerit eleuatus a materia uenenoſa cum dolore intollerabili, & uehementi calore per membra discurrens; quod periculo utique non uacat; Nullum tutius remedium inueniri potest, quam ubi in parte quapiā collectus sit, partē ipsam protinus infra supraque adligare, ac in medio nouacula, uel ferro candenti tumorem aperire. Deinde hiantem plagam aloë, boloarmenia ex rosaceo & aceto dissolutis implere. Transactis tribus diebus uel quatuor vulnus carne opplere, & ad cicatricem producere.

Optima uicinus ratione

Medicamentis per alium, & urinas pituitam educentibus ad motione

{ Physiici sūt.

Resolutione per halitum in pituitolis tumoribus mollibus, & paruis, ueluti est lupia in brachijs, cruribus, & lumbis partibus existētibus; ubi timor est ex dissectione, ne particula nutrita reddatur, tandiu molliter perfricantur, usque dum aliquantulum incallescant. & seipsis molliores quodammodo fiant. postea pars affecta aliqua re solida percutiatur, ut cythis distrumpatur & humor dissipetur; postea lamina plumbea super arctē ligetur. Quod si caput aut frontem occupabunt, præcidi possunt. & auellī, post quorum auulsioem, medicamentis utitur cruenus uulneribus dicatis.

Curantur  
causæ effi-  
cientis re-  
motione:  
vt

Eadem ratione (licet ualidioribus remedijs) curantur tumores pituitosi duri & magis, ut emplastro Galeni 6. de comp. med. secundum genera, quod & olei ueteris lib. j. viridis æris 3. xij. picis sicce unc. vj. laudani unc. iij. litargiri lib. j. Galbani unc. iij. litargiri cum oleo incoquito, cum autē inspissata fuerint pix & ærugo immittuntur, deinde laudanum galbanumq; atque sic in mortario transfusa subiguntur, & usui reseruantur. Verum si remedia huc spectantia plura requirīs, multa extat copia apud graues auctores ad strumas dicatas, ideo illuc recurre.

Suppuratione quando his remedijs nil proficimus Haliabbatis emplastro, aut quid simile quod constat farina hordeipice & olibano cum lotio pueri, uel decocto coriandri, ut placuit Auicennæ, simul mixtis, utitor.

Apertione,

{ Ferro ut docuit nos Albucasis, & deterſione unguento apostolorum aut aut ægyptiaco medicamento exedenti, quæ est illud quod constat calce & sapone; postea crustam secundum longum uersus profundum in cidito, & aliquo exedente medicamento uulnus impleto. inter quæ ualde est efficax arseni cum ad quantitatē medij grani frumenti adhibitur in robustis corporibus, & membris a principalibus remotis, nam in delicatis corporibus, & membris principibus propinquis minori quantitate imponendum & circum iacentes partes unguento populeone illinito. Quando porro glandula erit corrupta (quod ex duritie & tumore crustæ inductæ dignoscitur) tunc crusta butiro erit resoluenda, quæ ubi exciderit, si quicquam ex glandula remansit ægyptiaco unguento remouendum. At si nihil amplius super sit, more aliorum vicerum ad sanitatem perducatur.

# Tumorum præter naturam.

215

Naturalis, quæ est boni sanguinis scx, colore nigra, sapore acetosa, quæ si peccat quantitate verum scyrthum, sed non exquisitum procreat, tamen 14. Meth. ne nominibus contendant Galemus etiam & hoc exquisitum nominari penitus cuius causa	Materialis. i. subiectiva, quolibet est corporis pars exterior	Formalis	Tumor durus fræ insensibilis Tactus renitens Colore fusco vel liuido Dolore carens
	Efficiens		Humor melancholicus naturalis Temperamentum Aetas Vicius ratio } melancholica.

It. Melancholic

In se, vt	Quædo humor melancholicus torretur, et putrescit. 14. Meth. de Atrabile & 4. Aph. 21. Quando reliqui humores per assationem in atrabilem cõuerunt. hæc 3. prog. 19. prima est deterior	Formalis	Materialis id est, subiectiva, quolibet est corporis pars exterior, sed præcipue faciei, & mulierum mammæ.	Tumor liuidus seu niger Venæ quæ in ambitu sunt intumescunt. Tumor visco molliis tactu durus Dolor pungitiuus Quod si erueretur saniem olim mittit Profundum suffodit
	Quædo humores incuria medici nimis in frigidando aut resoluendo lapidescunt & tunc generantur		Efficiens humor melancholicus non naturalis.	
Nō naturalis, vel	Admixture aliorum humorum, vel	Aequaliter, & æquales gignit affectus	Scurthi illegitimi, sed non exquisiti, vt quando pars non omnino sine sensu est, sed ægrè sentit.	Scurthi exquisiti; quando sine sensu omnino in Tophaceam naturam concretus est humor, & hoc tamquam incurabiles curare ne aggreditor.
	Inæqualiter vt si Melancholia superet			
		Sanguinem	Producit	Scurthum Phlegmonosum
		Bilium		Scurthum crispelatosum
		Pituitam		Scurthum cedematosum.

Curatur cause efficiētis profi-  
gatione, vt

Optima uicijus ratione  
 Euaeuacione } Sanguinis mifione } Medico sunt propria  
                               Pharmacia  
 Repercufione aliqua moderata in principio

Refolutione: Quæ fit medicamentis mixta m faciliatē habentibus. Quale est medica-  
 mentum Rafis 7. ad Almaforem, quod ʒ. Bdelij, armoniaci, galbani an. par. æqua. teran-  
 tur in mortario cum oleo de lilio, deinde fume mucilaginem fenigreci, feminis lini &  
 ficuum ad pondus omnium prædictorum, terantur omnia simul donec in unum coeant,  
 & fiat emplaftrum. Vel cataplafmate Galeni 14. Meth. utere quod confutitur ex radi-  
 cibus altheæ, adipe anatis, uel gallinæ liquatis, & contufis.

Curatiōem con-  
fequimur causæ  
efficiētis atq; uicijus  
ne. vt


Optima uicijus ratione  
 Vniuerfali vt } Sanguinis mifione } ad phyficum attinent  
                               Pharmacia


Euaeuacione


Particulari; vt fi per chyrgiam cancrum fanari liceat, quod uicijus est  
 protius extinditū, & fanguinem fati multum effluere linito, cras iorem-  
 que ex uicijis partibus exprimito, atque affectum iandem ut reliqua ul-  
 cera fanato.

Repellentibus in principio ante medicamentum, & in purgatione, ut Solani fucco uel medi-  
 camento ex pompholyge, aut Diapalma doloroso loco applicatis medicamentis emol-  
 lientibus, & refoluentibus, vt medulla vitulina, ceruina, & fepe urfino aut Taurino, & adipe  
 anferina, aut gallinacea cum radicibus altheæ, aut falij maluz decoctis, contufis, & ap-  
 plicatis. Quibus, materia emollita, fi acuum admifceatur efficaciffimum. 14. Meth. erit  
 remediū. Sed uide ordinem quem fecutus est Galenus fecundo ad Glau. in cura Cercilij  
 pueri fcyrrum in femore habentis in fcyrrhoſis affectibus tendonibus & ligamentis contin-  
 gentibus, quotidie pars oleo haud adſtringente, quale est fabinum, aut in quo altheæ radix,  
 aut cucumeris afinini incocta fit, perfundenda est; deinde lapis piritres, aut eo quo triticum  
 teritur igni candens aceto acerrimo extinguendus est, & in fumo aſcendeme pars affecta com-  
 moueri debet. atque ex inde rurfus medicamentum quod emollit imponendum.

Finis Tumorū præter naturam.







♂. Vni-  
tione ex  
tremarū  
partium  
lenissi-  
mē tra-  
ctando  
idque fit

Per se. i. quando si-  
ne aliorū ope con-  
crescunt, & coa-  
lescunt, ut sunt na-  
turaliter mollia,  
veluti caro, & u-  
niuntur.

Ope aliorum subsistunt; vt sunt dura & sicca omnia ueluti ossa, quæ porro sarcoide coalescunt.

Δ. Con-  
seruatio-  
ne corū,  
quæ sunt  
unita, vt

Decenti  
ligatura

Vinculo, si solum in carne sit continui diuortium, cum quo neque symptoma aut alius affectus sit, & sola fascia orbiculatim diducta cum oui cāsido utendum, tertiā; die 3. Meth. a mouenda

Sutura; Quando vulnus magnum adeo est, ut ligatura committi nequeat, & glutinatoria superponenda, quæ exitcare fluxam humiditatem ualant & an influs prohibere; talisq; apparatus usque in diem quartum mutari non debet, nisi aliquod symptoma superueniat.

Fibulis; ubi in carne adeo hiāt vlcus ut sutura difficile ora attrahantur

Incarnatiua; Quæ sit fascia adeo lata (Celsi auctore) vt non tantum vulnus sed etiam labra vna circumuolutione apprehendat, a duobus initijs versus medium eiusdem circumuoluta; & principium deligatur debet fieri ex parte aduersa loci vulnerati; du- cendo alterum fasciæ principium versus partem superiorem, alterum versus inferiorem; debetque supra vulnus artior esse ligatura quam in paribus adiacentibus, extremaque fasciæ acui sunt suenda: competit recentibus vulneribus.

Expulsiua; sit fascia ab altero tantum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri (si os vulneris spectet ad partem superiorem) vbi artior esse debet, ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione eam paulatim soluendo dispensatur; con- uenit maximè antiquis vlcibus, varicibus, & tibiæ inflationibus, hæc ligatura.

Retentiuā: sit linteolo, seu fascia vnicum finem seu caput, vel plurium brachiorum (pro- ut res exigit) habente; cuius deligatur principium supra laborantem locum iniecta- tur, & in parte opposita nel nodus, vel sutura fiet; competit hæc sutura membris, quibus arctatio fieri nequit, ut in collo ventre & eiusmodi

Apposito membri situ. i. operando ut vulneris hiatus semper deorsum spectet, fundum uero sursum, ut secundo ad Glau. & 3. Meth. Galenus adnotauit: sin autem sectio ad opposita (nullo alio im- pediente) fienda:

Sutura

Incarnati-  
ua quæ fit  
quinque  
modis

Primo acn & filo serico suendo, incipiens suturam in medio vulneris de- in in medio spatio utriusque lateris, & in procedatur, donec vulneris labra ritè commissa fuerint; spatium inter puncta sit unius digiti.

Secundo pinnis acubus intro ductis filum circa eas re- uolatur vt facere solent mulieres, dum suas acui consueuant.

Tertio stuppis & ontortis & gracilibus

Quarto fibulis ab utraque parte recuruis

Quinto pannis qui figuram triangularem referant, uisroso linimento ac pertinaciter hærente oblititis; hæc futura faciei, & collo maxime com- petit

Hæc magnis & profundis vul-  
neribus.

Sanguinis suppressiua; quæ fit acn filum trahente, traiectis oris vulneris per modum reuolutionis, vt pelles consui solent

Conseruatiua labiorum in vnum adductorum, fitur præcedentes sed non ita arcta esse debet. competit hæc sutura, ubi amissa est caro, & dilaceratio adeo magna

Illud autem semper adnotandum quod antequam vulnera suamus, ipsa prius a sangui- ne purgemus.

8. Con-  
seruatio  
ne partis  
læse

Optima uictus ratione, quæ ad physicum spectat

Medicamē-  
tis vt

Sanguinis missione  
Pharmacia

secundum de-  
bitam

Quantitatem  
Qualitatem  
Modum

hæc in-  
dicant.  
Plenitudo  
Vulneris magnitudo  
Virium robur  
Aetas  
Temperamentum  
Regio  
Victus rō præcedens  
Consuetudo

Locum; Nam semper per contraria secundum rectum vena secanda uenit, ant medicamēto purgandum 4. Meth. Galeno auctore.

Infrigidantibus primis saltem diebus: postea vino stiptico pars perfundenda

Apertione aliquando ex aduerso in vulnerata parte utendum, ut in apposito membri situ est adnotatum.



\*. Accidentium correptione: Hæc ad physicum ut plurimum pertinent; licet quæ ad chyrurgum proprijs symptomacibus, secundum seriem literarum propria subiunguntur remedia

- Optima victus ratione
- Vulnerum neruorum curatio communis ad præcipitur
- Euacuatione } Venæ sectione } hæc ad Medicum attinent  
Medicamentis }
- Localibus præsidijs, quæ tepida calore esse debent. 6. Meth. & quæ ualèter exicant sine molestia tamen. Verum cū magna sit hominum differentia in tēpera turis ideo inter hæc 3 de comp. med. secundum genera duo medicamenta in promptu habeto alterū altero ualentius ex eodem genere medicamentorum confectum. Propriam vulnerum neruorum curationem nūc subscribimus.
- a. Neruo puncto & punctura est ceca: cutis in vulneris orificio aperienda 3. do comp. med. secundum genera. & oleo dulci acū calido, & non frigido, quale est sabinum ut ibidē & 6. Meth. Galenus consuluit; ubi plura huc spectantia adinueniuntur remedia.
- b. Neruo præciso secundum longitudinem; vulneris labra exactè committenda non sunt, sed in loco procliuiori turunda aliqua mollis oui luteo, terebentina, & croco illita, immittenda, alijsque remedijs utendum, quæ traduntur à Galeno locis supra citatis; & supra lana molliissima ex oleo imbuta ponatur, conserueturque semper pannis calida, quando frigidum sit neruis inimicum.
- c. Neruo transuersim præciso secundum partem; ijsdem remedijs utendum, ut paulo ante monuimus; uerum si timcamus conuulsionem, reliquum quod remansit præcidi debet, nam tunc conuulsionis periculum non sequetur, debilis tamen particula remanebit. 6. Meth. Verum lesio quam mors potius est optanda. 12. Meth.
- d. Neruo præciso secundum totum, & apparente nudo. Medicamenta eiusdem generis applicari debent, uerum lota prius, ut minus mordeant, oleisque minime utendum.
- e. Neruo contuso cum superiacente cute sabbarum farinam cum oximellite dilutam, aut eruinā farinam cum sapa, & modico aceto, si magis siccare desideras, adhibeto. Quod si magis adhuc siccare cupis, irim quoque illiricam, uel florentinam immittes: Aut oui candido & rosaceo illines, sedatoque dolore, uino quod crassū sit subtrahis: & adstrictionis particeps, partem fouebis.
- f. Neruo contuso sine cute, partem oleo irino, aut rutaceo, aut anetino continuo fouebis, & lannam prædictis oleis imbutam supra pones.
- Auersione ventosis, strictionibus, & ligaturis, primo quidem in propinquiorebus partibus deinde in remotioribus; Quibus non conducentibus, sanguinis missione per interualla utendum.
- Infrenatione sanguinem aut
- Incrassando fructibus stipticis & austeris  
Stupefacientibus a qua frigida tam ebibita, quam circa locum ex quo fluit, proiecta 5. aph.
- Sutura communi, uel ea quam pelliones facere solent, præsertim in magno sanguinis fluore, posthæc puluis adstrictiorius superponendus, dein stuppæ oui candido imbutæ, & puluere rubro, apponendæ sunt; Talisque modus futuræ conuenit uulneribus sine deperditione substantiæ.
- Linamentis seu turundis siccis, uel aceto, aut medicamentis sanguinem suppressantibus illinitis, vulnus (prius puluere rubro adstrictior ioue conspersus) oppleatur, supraque spongiam aqua frigida madefactam imposito, & adligato; competit hic modus vulnere cum deperditione substantiæ.
- Totius uasis præcisione, & hoc quando uenæ aut arteriæ in profundo sunt sitæ. 5. Met. posthæc puluis sanguinem suppressans aspergitur, & spongia, ut supra madefacta, superliganda.
- Deligatura, quæ cōpetit arterijs in penitioribus partibus delitescentibus. Itaq; arteriæ denudandæ sunt, & hamo apprehensæ filo serico fortiter sunt adligandæ ad uasis radicē 5. Meth. Postea quā citius medicamentum incarnatiuū vulnere imponendum, ut uulnus carne oppleatur, priusquam uinculum soluatur.
- Aduersione, quæ fit ferro candenti, aut medicamento crustam inducente, inter quæ arsenicum principatum obtinet; conuenit hic modus uenis ex exione ad partem. 5. Meth.

h. In ecchymosi in principio repellentibus, doloremque sedantibus utendum, qualia sunt oui candidum, rosaceo subactum, ut uenularum tunicæ aliquam densationem accipiant, postea resolutione; quæ uariatur iuxta materiæ fluxû situm. Nam si in summa cute est sanguis, solis calefacientibus & siccantibus cum resoluito, ut est illud quod constat vino, melle, & sale, aut id quod & ceram & cuminum, vel quod ex decocto calaminthæ & hordæi farina paratur, aut quod ex fursure, absinthio, cumino, & aneto aqua vel uino coctis conficiuntur. Si uero in profundo materia fluxerit scarificatione, & maximè resoluentibus, quarto Meth. utendum.

i. Vulnus simplex solo uinculo orbiculatim diducto cum oui candido curatur.

K. Vulnus dolorosum fouendum ex rosaceo uel oleo communi: Quibus si admisceatur (præsentem maximam inflammationem) oui album, eaque absente oui luteum, præstantius erit remedium. Quod si dolor erit leuior, papauerino utendum, & necessitate maiori cogente opij aliquid, vel mandragoræ adijciendum; sed de his apud graues auctores agitur, ideo illuc recurrendum. Quibus si dolor non sedatur sed augetur, Neruum esse læsum significatur, cui ea quæ neruis sunt dicata conueniunt.

l. Vulneri cum pruritu: Aqua calida Hippocratis & Galeni consilio membrum fouendum, aut unguento albo Pauli, vel Rasæ camphorato & succo plantaginis diluto, uel populeone illinendum.

m. Vulnus cum delirio. consulendus est in hoc symptomate aliquis peritus medicus, qui uapores caput petentes aliquo ingenio deorsum trahat.

n. Vulnus cum spasmo. Dum sedantur accidentia, cerebrum est roborandum, ideo capite abrafo oleoque liliorum alborum peruncto, totam ceruicem & spinalem medullam, & inguina, & subaxillas eodem oleo inungemus; & quæ de neruis supra scriptisimus considerato.

o. Vulnus cum paralysi. i. membri resolutione: facta vniuersali purgatione unguento balsamite Mesue utendum, verum considerato.

An id quod intendit  
chirurgus possit  
aliqui necne quod  
indican

Aetas. Nam in ualde senibus paralisis difficile curatur, eo quia ut inquit Hipp. senibus parum calidi est innati.

Morbi magnitudo. Nam ab insigni contusione, & neruorum diuisione paralisis prorsus est insanabilis, & contrarationem recipit ut 3. de locis aff. contingit. in Pausania illo syro sophyste.

Locus affectus. Nam inquit Auenzoar, si nerui anhelitus fuerint uulnerati, aut alio quouis modo insigniter affecti subita mors imminet. Verum si locus paralysim patiens non imminuitur, nec emarcescit, aut color eius non immutatur, aliquid est spes salutis, & contra contrarium iudicatur.

p. Vulnus cum sanguinis profusione curatur eadem ratione, quam supra in uenis & arterijs sanguinem fundentibus, diximus.

q. Vulnus cum syncope: Quando timemus ob multam sanguinis profusionem & dolorem syn copim futuram, panis frustulum uino optimo flauo colore, & substantia tenui. 12. Meth. aque rosaceæ momento diluto, ægro ad sugendum præbeto, atque ex uino modicum quid bibat. Cæterum si iam syncope uexetur, eius faciem aqua rosacea, uel frigida, uel utriusque mixta adiecto aceti momento irrorabis, & naribus infundito, extrema fricato, pilos, narium, & aures uellito, & cætera facito, quæ medicus præsens fieri præcipiet.

r. Vulnus cum intemperie calida, quæ rubore & loci uelicatione deprehenditur, rosas, plantagine, & unguento albo curetur.

Cum intemperie frigida, quæ liuido colore & mollitie cognoscitur, uino & unguento nigro aut fusco, aut basilicone sanatur.

Sic si humida aut sicca intemperies vulnus apprehenderit, suo contrario curatur; Quod si eiusmodi accidentia vulnus in vlcus degenerauerint, ad ea quæ de ulceribus sunt descripta tunc decurrendum erit: Quod si febris adsit, consulendus erit peritus medicus.

f. Vulnus cum Phlegmone, aut alio quouis tumore: Inflammatio in uulneribus maxime accedit cum uel os, uel neruus, uel musculus, præsertim in eius capite, læsionem accepit, aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris effluxit. Quod si accidit, sanguinem statim superprimere non expedit, sed patiendum est fluere dum tutum erit. Quod si corpus robustum, & iuue-

& iuvenile fuerit, etiam ex brachio euacuandus sanguis erit Cello auctore libro quinto: Sic operandum circa nervos & mufculos ut fupra monuimus. Quod fi iam inflammatio in abfceffus. i. ad fuppurationem tenderit, ad ea recurrendum, quæ fupra de tumoribus præter naturam fcripfimus.

- t. Vulnus cum carne fupercrescenti, fic tractatur. Carnem fupercrescentem medicamentis ualde exiccantibus & acribus remoueto, ut calcantho, vitriolo, fpongia, hermodactilis & eius modi, deinde unionem perficito.
- u. Vulnus vlceribus admixtum, ea funt faciendæ in hoc cafu quæ de vlceribus funt denotata.
- x. Vulnus magnum. Sutura & puluere rubro quatuor diebus curatur, deinde 3. Meth. uino. Vel ut voluit Guido a Gauliaco puluere rubro Terebintinz admixto; & hoc vulnere existente fine deperditione fubftantiæ. Nam fi fecus erit, ea requiruntur quæ paulo infra in vulnere profundo dicentur.
- y. Vulnus paruum ut fimplex curatur.
- z. Vulnus breue, longum, latum, anguftum & fupercrescentem eo ordine, quem in reliquorum vulnere curatione feruauimus.

& vulnus profundū

<p>{ Sine deperditione fubftantiæ, vt magnum curatur, dummodo fanies intus non remaneat, nam tunc effluxione (Galenī confilio 2. ad Glau.) utendum, quæ fit aut appofito membri furi, uel contrarij loci diuifione, quæ in dicant loci affecti natura, &amp; vlcneris magnitudo.</p>	<p>{ Cum deperditione fubftantiæ &amp; tunc curatur.</p>	<p>{ Vnitione Cauitatis repletionem, hæc in exequendo priorem præcedit, quæ quibus affe- quamur quatuor indicant.</p>
--	--	---

1. Primum vlcneris fubftantia, hæc enim indieat carnem eandem specie cum ea, quæ periit regnendam effe, quod fit ipfius Naturæ beneficio; Verum quia in carnis regeneratione duplex fit excrementum, nempe fanies, & fordes, ex prima redditur vulnus humidum ex fecunda fordidum; ideo exiccantibus & expurgantibus eget; idque primo ordine ficcantium & detergentium; ut funt Thus, hordacea farina, fabacea, & cruina, iris & eiusmodi.
2. Secundum ægri temperatura, eiusdemque partis affectu; quæ fui custodiam indicant. Quapropter licet vulnus vt vulnus est ficcantia postulet; & ficcantium quadam magis quædam minus ficcant; ægri & partis affectu natura, quæ fui custodiam indicat; qualia funt eligenda demonftrabit: Nam in ficcis corporibus, quæ magis ficcant, in humidis uero quæ minus adhibemus; ut nouellam carnem deperditæ fimilem regeneret Natura.
3. Tertium funt adnexa, vt partis laborantis intemperies, & aeris temperatura, & reliqua quæ curationem impediunt. Quæ indicant, quod antequam vlcneris curationem aggrediamur, ea fummo ueamus (3. Meth.) quæ curationem prohibent, ut funt Eriſipelata Phlegmones & eiusmodi.
4. Quartum contrariæ funt indicationes ut quando temperies totius, non conuenit cum temperie partis affectu; hæc indicant medicamenta adhibenda magis uel minus ficca effe prout magis uel minus temperatura totius & partis diftanta medio temperamento. Vt fi eodem gradu temperatura totius difteta medio in humido, ficut pars affecta diftat in ficcato, eligi debent ficcantia temperata. Quod fi temperatura totius difteta medio exempli gratia tribus gradibus, & pars affecta gradibus quatuor; Tunc eligi debent ficcantia primo gradu. Sed quoniam hæc omnia coniectura noſci poſſunt, ideo requirunt chyrgurgum ualde exercitatum, & in cognitione totius & partis, & naturæ fimplicium medicamentorum omnem speculationem habere.
2. Vulnus æquale cutis regenerationem requirit; verum quia ex femine ortum hæc habet, id eotalis qualis erat, omnino regni non poteſt; ergo fimile quiddam cuti reſtituimus medicamentis 3. Meth. ficcantibus & adſtringentibus, & talibus, quæ non ſolum humorum redundantiam conſumant, ſed & quod ſecundum naturam eſt aliquid deradant. hoc autem facere poſſunt primo & per ſe frigida & ficca, ueluti galla immatura, cortex granatorum, balaufium, acacia, ſumach; & eiusmodi. Per accidens uero poſſunt calida medicamenta,


dicamenta, quæ carnem colliquant 5. simpl. med. ut sunt calcitis, æs ustum, æris squamina, mysis, alumen, & eiusmodi.

Vulnus contusum, suppuratione curatur; quam molimur his quæ calfaciunt, & humectant, nam putredo ex calido & humido 4. Meth. & nouæ carnis regeneratione, ut de vulnere profundo adnotauimus.

Quod si caro esset multum dilacerata, & futura uideretur esse utilis, consuatur quadam futura laxa labia retinente.

Quod si ab ambiente labra facta essent callosa, & dura, nouacula (nullo alio impediēte) amoueantur. Et si ad gangrenam degenerare uideatur (quod ex tarda putrefactione, fusco, nigro, aut liuido colore cognoscitur) unguentum ægyptiacum, aut aliud simile admouero.

Finis Vulnerum.



	Prauus victus ratione	Quid sit agendum, indicat affectus, qui sui ablationem requirit. ideo	Vlcus qua vlcus est modice siccari postulat.
Ascendentes succorum sunt vitia, qui generantur	Totius corporis uel alterius membri, ut hepatis, & lienis vitio	Curatio vniuersalis (nam particulari vnicuique differentiæ secundum literarum seriem apponemus) in qua considerandum	Vt autem alteri affectui complicato, tunc ut 4. Meth. vel. require hoc signum. ⊕
Vlceris causæ efficiētes, vel			<p>Simplex</p> <p>Vlcera carnis interperies</p> <p>Sola hæcque Composita Cum accessorio tumore</p> <p>hæc multoties vlcera ægre sanabilia efficiunt.</p> <p>Vlceris</p> <p>Figura. Nam vlcera rotunda pessima esse solent ac magno negotio ad cicatricem reducuntur.</p> <p>Situm. Nam vlcera, quæ in extremitatibus musculorum, dorsis, tibiis, vel brachiorum sunt, periculo non uacant, ut voluit Auicenna.</p> <p>Item vlcera interna membra occupantia periculosa sunt eodem auctore teste.</p>
	Intemperies ex causa antecedenti percreta.	An id quod intendit chirurgus possit affectui necne indicant.	<p>Qualitatem. Nam vlcera circumglabra praua sunt, prauum enim humores, illic confluentes, de fluxu pilorum faciunt. Item vlcera, quæ totius corporis colorem præferunt malignum, vitium adesse magnum in hepate aut sanguine denuntiant.</p> <p>Humor fluens malus secundum</p> <p>Item vlcera, quæ aliis morbis succedunt, ut in hydropisi, mala sunt. Item vlcera, quæ fluant, siue in morbo apparent, considerata. Nam si liuescant, aut nigrescant, aut arida appareant, mortalia sunt.</p>
Cōiun-ctæ vt	Vulnus in vlcus conuersum.		<p>Quantitatem</p> <p>Osse caries: Nam vlcera quæcumque annua sunt 6. aph. 45. aut etiam diuturniora os abscedere est necessarium, &amp; cicatrices cauas fieri.</p> <p>Item ulcus omne, postquam carne impletum est; subito renouatur, periculum est, ne in fistulam degeneret. fen. 4. cap. 1.</p>
	Tumores rupti & aperti.		

<p>⊕ Vt autem alteri affectui complicato: vel</p>	<p>Affectus ē corpore prorsus est eximēdus.</p>	<p>sup</p>	<p>Optima victus ratione, quæ ad physicum attinet. Materie antecedentis auersione, ligaturis, perfusionibus, &amp; epithematibus, vnguentis refrigerantibus &amp; adstringentibus, vt ex bolo armenia, &amp; eiusmodi.</p>
	<p>Incōmodū quod infert vinere tentandum.</p>	<p>Idq; perfricitur.</p>	<p>Materie coniunctæ curatione { Sanguinis missione } hæc physici sunt. { Pharmacia. } Accidentium correctione &amp; summotione; idque assequimur, prout vniuscuiusque symptomatis &amp; affectus cum vlcere complicati natura requirit. Quæ nisi amoueantur, Vlcus sanari non potest: &amp; nunc subiiciuntur secundum ordinem alphabeti. Vlceris exiccatione, quod erat prima vlceris quæ vlcus est intentio.</p>

- A. Vlcus dolorosum, malam temperaturam, aut continui solutionem amouendo; sanatur: de quibus omnibus paulo infra suo loco dicitur.
- B. Vlcus sordidum, quod crasso excremento abundat, attenuatione, & resolutione curatur, ut lotionem aquæ marinæ, vel saporis, aut mundificatio appij, vel hoc quod & mellis vnc. ij. iuridis æris vnc. v. quibus si addatur iris, centaurium minus, aut aristolochia, validior fiet medicamentum.
- C. Vlcus saniosum; quod sanie multa citra erosionem scaturit, exiccatione mediocri medetur, ut plumbo usto, cerusa, litargiro, plantagine, & eiusmodi; aqua aluminosa, vnguento de plumbo & vnguento de calce.
- D. Vlcus cruentum, quod sanguinolenta sanie est plenum; præhabita vniuersali purgatione, & auersione & uiarum per quas materia fluit constrictione, vnguento albo camphorato, de bolo armenia, de tutia, aut de cerusa cocta utendum.
- E. Vlcus cum intemperie calida in frigidantibus temperandum, ut vnguento albo, de cerusa, de plumbo, aqua rosarum, succo plantaginis, solani, & temperuiux.  
Cum intemperie frigida calefacientibus utendum, ut vnguento basilico, citrino, fusco, & lotionem optimi vini tepidi, aut aqua cineris, & aluminosa.  
Cum intemperie sicca aquæ temperatæ foris curatur, quousque locus rubescat, attollaturque particule moles, tunc desinendum, & medicamentis humidantibus utendum.  
Cum intemperie humida, vino aut posca, aut decocto cuiuspiam austeræ herbæ partem lauamus, medicamenta que ad siccius transferemus.
- F. Vlcus cum Phlegmone curamus medicamentis, quæ desiccant & inflammationem arcent, ex liquidis bonū est vinum & posca (Paulo auctore) ex siccis verò quæ inflammationibus sunt dicata, excipiendo oleosa & acria; priuatim verò hoc cōfert, quod & Malum punicum dulci vino incoctum, & tritum adhibitur. At si erisipelas aut alij tumores vlcera vexent, ad illa recurrendum, quæ de tumoribus præter naturam prius adnotauimus.
- G. Vlcus cancerosum. Quod visu est horrendum, fetidum, labra habens dura, crassa, tumida, atque inueterata; colore fulcum aut liuidum; circa quæ locum venas turgidas crassoque sanguine plenæ habens, duplici nomine curatur.  
Verè; vt in homine robusta vltro à chyrurgo manum efflagitante, & in partibus vlcus conflens quæ ressecationem admittant.
1. Primò ab humoris melancolici affectu curatio auspicanda a physici est.
  2. Secundò torum carcinoma prorsus excides, sic vt nulla supersit radix, sanguisque sinendus est fluere partes vicinas exprimendo. 14. Meth.
  3. Tertiò cauterio æquali vel potenciali, ut arsenico, quo omnes passim morbi (Theodorico teste) primo die extirpantur, vlcus cauterizandum. Quæ dum sunt, semper circumuicina munienda sunt aliquo refrigerante, ut bolo armenia & similibus; Mortificatoque cancro, dolor sedandus oleo rosaceo oui luteo admixto, & crustæ casus procurandus butiro, aut simili unctiuoso.
  4. Quartò vlcus ipsum quod remansit, ut caua ulcera sanandum.



Nō uerē, ut in corpore ibecillius timido, & molli, & in parte, quæ opus chyrurgicæ nō pmitit.

Cancrum augeri prohibendum est. } optima uicū ratione  
commodis euacuationibus. } qd ad Med. cū spectat.

Loco affecto remedia imponenda, quæ dolorem leniant, refrigerent, & exiccant, sine mordicatione. cuius modi sunt solani succus Galeno, plumbum ustum & elotum, Vnguentum album, è litargiro, de plumbo usto, aut alijs id genus metallicis ustis & elotis. Aquæ etiam camphoratæ, & succi in mortario plumbeo ducti huic uitio efficaçissime admouentur; sic & plumbi lamina, multaque remedia palsim à Galeno, Paulo, Celso, Aetio, & alijs sunt descripta, ad quæ lector mittendus, quando hic breuitati studeamus, & singula remedia in medium afferre nequimus.

**H.** Vlcus putridum fumum fetidum, & cadauerosum expirans, sordes extraneasque caliditatem, & febrem habens, ubi ab excrementis corpus uniuersum tibi purum apparuerit; sic curabis; partem læsam cucurbitulis, scarificationibus, hirudinibus, atque lotibus (Aui cenna autore) à corruptis humoribus uindicando, deinde sordes ablundo, aut hydromellite, aut marina aqua, aut salsa; posthæc ulcus mundificabis vnguento apostolorum, aut Aegyptiaco, desuperque pones mundificarium aliud ex absinthij succo, melle rosato, farina hordei & mirtha compositum, & circum iacentes partes unguento ex bolo armenia illines, ac supra cætera prædicta puluillis ex stuppa, aut pannos lineos leues, polca aquosa imbutos adligabis. Si verò sordes in putredinem conuertatur, locus abluendus erit oxierato, aut aqua eineris, uel saponis, deinde emplastrum ex carnibus piscium salforum, farina orobi & aristolochia longa, & scylla, omnibus ex uino coctis, & cū melle mixtis superacomodabis. Quod si his remedijs ulceris malitia uinci non possit, ea admo uebis, quæ de vlcere maligno adnotabimus, scilicet cauterium actuale uel potentiale, ut arsenicum. Quibus non conducentibus, membrum amputabis.

**I.** Vlcus cauum carne est opplendum, ut in profundo vulnere supra adnotauimus.

**K.** Vlcus super crescentem carnem habens medicamentis siccantibus sanatur, è quorum tria sunt genera alterum altero ualentius. Mediocriter carnem exedunt diphryges, squama eris, & eiusmodi: Valentiora sunt asæ petræ flos, sory, calcitis, & similia: validissima ærugo, & sales omnes cremati.

**L.** Vlcus ambulatorium seu phagedenicum, in quo uitio succi corrosantis non solum partes putridæ, sed etiam sanæ depascuntur superficialiter; ut ulcus arrosum curatur, cum ab eadem causa efficienti, licet maligniori facta proueniat; ideo similibus remedijs, sed ualentioribus gaudet.

**M.** Vlcus malignum seu cacoethes, in quo malignitas occulta est, quæ prohibet ulcus sanari; Purgato uniuerso corpore, & remotis affectibus, & symptomatibus sibi complicatis; curator ualida citra demorsum exiccatione, quæ perficitur medicamentis adstrictoria & digerente uel præditis, qualia sunt terra sigillata, diphryges, alumen, & similia: Verum cum ampla sit latitudo medicamentorum exiccantium, quando altera magis, altera minus siccant, sic inter ulcera maligna alterum vlcus altero magis sit cacoethes; corporaque omnia, quibus mederi cogimur non omnino eandem temperaturam habeant; hinc fieri non potest, ut uno eodemque medicamento, omnibus indifferenter ulceribus malignis quæuis corpora occupantibus, medeamur. Sed tantum medicamentum pharmacorum. de comp. med. secundum genera, esse numerum oportet, quantus ipsorum quoque ulcerum extiterit. Ideo oportet chyrurgum omnia hæc præcognoscere & medicamenta imbecillia, modicra, & ualida sibi preparare, ut malignioribus vlceribus, & robustioribus corporibus ualentiora applicet remedia, ad mediocria uero vlcerà, & molliores, & delicatioris corporum habitus imbecillioribus medicamentis utatur. Quæ qualia sint Gale nus loco supra citato optimè distinguit.

**N.** Vlcus Rheumaticum, in quo abundè sunt humores vlcus lanescere vetantes (corpore uniuerso prius, secundo ad Glau. congruis remedijs, & presertim venæ sectione purgato, & inani to) sic sanato partem affectam repellentibus illinito, deinde exiccantibus & detergentibus humores in parte collectos vacuato. Vltimo partem affectam confortato, ne amplius fluxionem recipiat.

**O.** Vlcus verminosum, in quo apparent vermes ex humorum putredine, sic curatur. Primo putredo arcenda, postea vermes exortos succo aut decocto absinthij, agrimonij, centaureæ, marrubij & eiusmodi utendum. Priuatim verò Archigeni & Theodoro hoc valet, quod & cerusæ & polij parem mensuram, & cum pice liquida illinitur.



**P.** Vlcus atrofum, quod vitio succi biliosi corrodentis & escaram facientis semper crescit, sic tractatur. facta vniuersali purgatione (nam partibus quibusdam medicamenta discutientia applicanda non sunt) (t. 3 Meth.) ubi redundantia in toto corpore, aut superiacente particula (subest) commodè feceris (particula supra modum calefacta) si ipsam statim frigidis stipticis exicantibus refrigerabis, totam particulam vlceraam aqua aluminosa ablundo; nam influentes humores potenter repellit hæc aqua, & siccat, vt voluit Auicennas. aut affectum locum irrigabis aqua plantaginis, aut rosarum, aut ea in qua terrum sit extinctum, aut decocto cyperi, cupressi, mirobalanorum, plantaginis, malicotij, balauftij & similium: circumiacentesque partes boloarmenia illiuito; In medio verò vlcis puluis exiccans, aut litargirum, plumbum ustum, rutia, & eiusmodi apponito; Item plagellæ Vnguento albo Rasii illitæ, aut unguento de Tutia supra vlcus ipsum danda sunt, & plumbaceolus posca imbutus super addendus; dein ligatura exprimente alligandum erit. Solutio alterius diebus tantum fienda, sordesque molli linteolo & sicco detergenda; Quod si partes vlcis adiacentes inflamari videantur, Vnguento Galeni & palmulis confecto, oleoque mirteo aut melino aut omphacino dissoluto utaris. At si dories circa vlcis la bra apparuerit, ipsum vnguentum & palmulis oleo veteri aut de cherua soluendum est. Ceterum si vlcera ipsa talia medicamenta contemnunt, Corpore iterum a superfluis repurgato, inuisione cauterio actuali aut potenciali materia coniuncta absorbenda veniet. Quod si hæc parti profecerint, sublimatum pauca quantitate tuto adhiberi potest; locus autem vlcis circumpositus semper refrigerantibus muniendus erit. Porro si ne his quidem poteritis auxilijs malum cessarit, membrum amputare necessarium est, ut voluit Auicennas.

**Q.** Vlcus cauerno sum orificulura habens strictum, profunditatem vero latorem, modo sursum, modo deorsum, modo ad latus, modo ad ossa vergens, sensumque effugiens, multosque anfractus habens atque cuniculos, citra tamen callositatem & duritiem, sic curatur.

1. Primo morbi accidentia sunt moueantur.

2. Secundo sordes abluenda & exiccanda veniunt. Modus autem exiccandorum remediorum variatur penes varias sinuū differentias à positionis situtantum Galeno acceptas. Nam si sinus est sursum, adeo vt eius orificium deorsum spectet, tunc facilis est sordium expurgatio, quando per os eius facile sanies defluat. Sed neque cum ad latus declinat, aut deorsum aut ad ossa impedit, quin & sinu sanies emanare queat, dummodò membri appositio optima (secundo ad Glau.) fieri possit; Verum si situm commodum parti dare non possis, quo liberè sanies effluat: Tunc pars ex a dverso, vel & melius totus sinus (nullo alio impediēte) refecandus erit. Quod si neque apertio in imo, neque cauitas tota dissecari possit, sinus totus eluendus erit, primo detergendijs vt melicrato, aut vino (Galeno) aut valentioribus prout sordes erit malignior, vt aqua aluminosa, Auicennæ, aut vnguento ægyptiaco aqua & melle liquato, Albucasi, aut ex charta combusta medicamento Galeni. Verum si vlcus calidum fuerit, adeo vt virus rubens, & lotura recentem materiam carnis per simile appareat, abluendus erit aqua mulla recenti, in qua lenticula, hordcum, rosas & balauftium incocta sint. Si verò frigidum sit vlcus, adeo vt sanies aquosa & tenuis deduat, mulla in qua coctum sit marthubium, absinthium, pimpinella & mirra eluendum est. & his remedijs omnibus vlcus purum reddetur, quæ erat nostra secunda intentio.

3. Tercio cauitas implenda, iuxta Auicennæ Galeni interpretis intentionem, medicinijs currentibus lauiatis, & viscosijs vt adhereant, intromissis clysteribus aut tentis cannulatis, vt voluit Guido a Gauliaco, & ellychnijs, vt emplastrum Apostolorum ab eodem Auicenna ex petiis, sed præstat subscribere medicamentum apud chyrurgos maxime exercitatum, quod & aque decoctionis hordei lib. j. mellis rosati vnc. iij. Sarcocollæ 3. ij. Mirrhæ Thuris an. 3. j. vini odoriferi vnc. vj. coquantur omnia simul, ad tertiam partem consumptionē, quibus addi potest & aloes, & supra ponenda est Galeni consilio spongia noua quæ mollissima ex oxirato, & incipiens ab vlcis fundo arde (sine dolore tamen) alligetur, & in eius ore finiat, ibique fascia sit minus laxa & secundo uel tertio quoque die spongia eximatur, confide-

returque sanies multa an pauca cruda an cocta ad os vlceris effluxerit. Altas enim partes coisse testatur pus coctum ac paucum præcipue si dolor aut tumor non appareant, & contra contrarium iudicatur. Quod si in secunda spongiæ permutatione pus crudum appareat, affecto loco medicamento ualde exiccans (cuiusmodi est Galeni medicamentum cithrum appellatum 2. de comp. med. secundum genera.) apponendum est; aut diapalma ut uoluit Guido, aut aliud simile ab ipsis descriptum.

R. Vlcus fistulosum, quod altum angustumque est, cum oris duritie & callositate, cuius multe sunt differentie, medici intentionem plurimum variantes, ut in hoc schemate apparere potest.

Fistulæ differen- tiæ su- muntur vel à	Tépo- re ut	Recentes c.	Curâ tur	<p>Præmissa uniuersali purgatione, &amp; datis aliquibus potionib. fistulis dicatis, ut quæ R. Agrimonij par- tes iij. plantaginis par. ij. foliorum olivæ par. j. scin- dantur minutim, &amp; conrundantur, postea in uino al- bo coquantur, &amp; fiat colatura; aut R. filicis maris par. iij. gentianæ par. ij. centaury par. j. coquantur ut prius, &amp; qualibet die sub aurora ciathus unus ad- ministretur. Quibus potionibus si non nihil ligni guaiaci aliquot horas maceretur, postea lecto igne leuiter decoquatur, &amp; ex colatura quantum asside- ti in edico satis esse uidebitur mane bibendum of- feratur, feliciori cum successibus se habebit, pos- tea ad ea, quæ particulariter fistulam sanant de- ueniendum.</p> <p>1. Primo fistulæ orificium si non satis hiat dilarandû, quod fit aut ferro, aut tenta ex radice gētiânæ, ari- stolochiæ, brioniz, serpentariæ, aut spongia, quæ in principio magis conuenit.</p> <p>2. Secundo loco 2. callos eximere conuenit, ipsius- quæ figura prorsus eximenda, aut medicamentis acrioribus, qualia sunt troscili asphodellorum, aut penicilla arsenico inuncta, quæ neminem se- fellerunt, &amp; hæc competunt altis fistulis &amp; recen- tioribus.</p> <p>Quod si fistula multiplices habeat meatus, adeo ut linamenta intromitti nequeant, aceto medica- menta sunt mollienda, &amp; clystere auriculari in- fundenda.</p>
		Inueterata		
	Figura ut	Rectæ		
		Tortuosæ c.		
	Numero ut	Transuersæ		
		Simplices b.		
		Duplices d.		
		Triplices		
	Magnitu- dine & si- tu ut	Breues. i. specifica- les		
		Altè descen- dentes ad ossa, carti- lagines aut ad interio- ra		

Verum c. antiquis fistulis plurimum ualet linimentum hoc quod R. vnguenti ægyptiaci vnc. s. arsenici serop. j. lixiuij vnc. iij. aquæ rosarum vnc. ij. sublimati 3. s. bulliant ad eosum ptionem tertiar partis, & injecto medicamento, fistulæ os eo modo occludendum, ut de si- nuoso ulcere adnotauimus, ne id resiliat.

Quod si multiplices fistulæ breues intraque d. carnem sint arida medicamēta superius addu- cta calamo scriptorio insufflabis.

Si quādo uero longior & transuersa c. est fistula (inquit Celsus) demisso specillo eōtra prin- cipium huius, incidi commodissimum est, & collirium vtrinque dimitti, in quo casu uoluit Arnaldus aquam fortem alchimistarū administrari, & iste est vnus modus calli eximendi.

Alter modus euellendi callos, & fistulæ figurā est incisio, postea adustio ferro ignito, aut caustico medicamento. Igitor dimisso specillo, supraque id accommodata figura, scalpello (nullo alio impediēte) sinus, eiusque plexus (si ad sunt) toti præcidiendi, dein oui candido penicilla intincta vlceri sunt imponenda, postea die locus adurendus vel ferro ignito vel puluere asphodelorum, vel arsenico. Cæterum in eircu ita semper refrigerantia & reprimen- tia applicanda sunt. Deinde adusta fistula primis saltem diebus mitigatorio aliquo medi- camento, ut oleo oui luteo admixto utendum; postmodum ea quæ crustas ex ferro ignito aut caustico medicamento resoluunt admovent; a quarum usu prius non desistito, quam cru- sta deciderint, & in pus conuerse fuerint.

3. Tercio si aliqua sordes remansit post tales operationes, mulso, uel aqua in qua eruum coctū sit, & mellis aliqua parte adiecta locum abluito, uel tali medeto medicamento, quod & terebentinæ in aqua uitæ ablutæ unc. iij. succi appij, cinoglossi an. 3. vj. mellis rosati colati vnc. j. s. aristolochiæ rotundæ 3. ij. farinæ lupinorum unc. 5. coquantur succi cum terebentina & melle ad consumptionem medietatis, dein reliqua admisceantur. Quod si prædicto medicamēto aliquid mirthæ adieceris, sarcocollæ, iridis, radicis peucedani an. medicamētum optimum efficiet incarnatiuum, modo ex eo turunda illinatur, reliqua reperiuntur in antidotarijs grauium auctorum.
- S. Vlcus uaricosum uenas sanguine crasso turgidas habens, curatur uaricum euulsione, quem modum Hippocrates, Galenus, Aetius, & Paulus a deo distinctè & apertè declarant, ut copiat uerborum non sit hic locus.
- T. Vlcus cariosum sic corrigitur. Oportet ante omnia uiciatum os nudare ulcere exciso, donec undiq; totum os cariosum appareat; deinde os corruptum radendum quoultque album, uel solidum uideatur, deinde cauterium actuale, quo superflua humiditas exiccetur, administretur, postea oleo rosato & oui candido per tres dies utendum, & per tres alios dies oleo rosato & oui uitello, & desuper continuo unum de mundificatiuis nunc subscribendis usq; ad ossis expoliationem, applicatur. Ut agrestis papaueris & fici arboris folia cum polenta leuigato, & ossi sinus, uino prius loti, repleto. Aut semen iosciami, & atramentum sutoris pari pondere contrita imponito. Sed & radix peucedani contrita subito squammas ossium renouet. Aut hoc medicamentum tibi præparato, quod & unguenti Iliis unc. j. eusor bij subtilissime puluerizati vnc. 5. simul mixtis, & supra cariosum os ab ipsius abrasione apponito; uerum ucleris labra unguento Galeni uel rosaceo plagellis munito; hoc enim medicamentum breviori tempore quam cauterium actuale ossium squammas remouet. Deinde ut reliqua ulcera caua sanato.
- V. In sphacelo cutis, carnisq; & neruorum apparet corruptio: Quod si adhuc magis sequatur malum ut ossa etiam corrumpat Esthiomenus generatur. 7. de Anatomicis admin. & 7. aph. 50. Quibus prauis ulceribus, nullum melius reperitur remedium, ipsius membri excisione, & de his hætenus.

Finis.

Fractura est cōtinui solutio quæcumq; in ossibus cuius differentie alia	Simpli-ces. i. al-teri affe-ctui nō cōplica-tes. & sūt vel	Proprie. i. à propria essetia de sumptis, & cōsideran- tur, vel se- cundum	Lōgum, & formam re- presentat. vel	Oblongæ ossis fissuræ Vnguis & est fissura ossis quæ cum aliqua in parte recta sit, in extremo ta- men lunata euadit Squammæ
			Trāsuersū, & habet si- militudinē	Caulium Raphani Cucumerum
			Obliquum Celso	
			Longum transuersum & obliquum, quan- do ad similitudinem farinæ uel pollinis est facta, cum os in multas tenues partes sit contractum	
	Impro- prie. i. non a substantia rei, sed à parte affe- ctu acceptæ. ut fra- ctura		In caluaria	
			In maxillis	
			In naribus	
			In claviculis	
			In spina dorſi	
			In costis	
			In scapulis	
			In humero	
			In brachio	
			In femore	
	Compo- sitæ. i. al-teri affe-ctui cō- plicatæ, & dicū- tur, fra- ctura		In crure	
			In rotula genu	
			In digitis manuum & pedum.	
			Cum dolore	Υ
			Cum inflammatione	ϣ
			Cum pruritu	≡
			Cum contusione	ϙ
			Cum gangrena	ϙ
			Cum uulnere	ϙ
			Cum fragmento ossis	ϙ
			Cum superflua ossis humiditate	Δ
			Cum nimia ossis siccitate	Μ
			Cum callo nimium excreſcente	⌘
			Male ferruminata	⌘
				⌘

	Contundunt, ueluti dura & graui oia.		Transuersum suntq; vel	Exiguę require hoc signum. Magnę
Efficientes, quæ	Diuidunt, ut quę uulnera do incidunt.		Quid sit agendum affectus natura indicat, quæ sui ablatione requirit, idq; penes proprias differentias Galeno acceptas, ut fracturæ secundum.	
Rumpunt, ut in luctatoribus ex circulatorione, aliquando accidit.				
	Crafsities ossis fracti non naturalis			
Horum causæ				Longum; hæc comprimenda sunt magis. Meth. in ipso fracturæ loco, tum quod recessit suo acetabulo retrudendum; Reliqua vero omnia ad eundem se habent modum, ut de transuersis adnotabimus.
	Sis fractura est secundum longum, apparet	Dolor		
		Inæqualitas		
			Curatio in qui considerandum.	
Formales, quæ tactui subijciuntur; Nam		Ossa separata sentiuntur.		
	Si fractura est secundum transversum, tunc	Membrum figura inæqualis percipitur.		
		Manu uariè membrum tractatur.		
		Ossa colliduntur. Dolor adest.		
		Corpus membro fracto inniti non potest.		
			An id quod intendit chyrurgus possit perficere necne, uide hoc signum. X.	

**Loci affecti natura:** Nam ossa minime periculose franguntur media in humeris, brachijs, femoribus, cruribus, & digitis. Quo autem fractura propior capiti uel superiori, uel inferiori ipsius ossis est, eo peior iudicatur. ea itidem quæ in artuum uicinia est, curatu est difficilis, uel eo potissimum nomine, quod commodè ligari non possit, atque hæc ut plurimum motum relinquunt difficile.

Item fracturæ non pari dierum numero ferruminantur in omnibus ossibus, sed in alijs tardius, in alijs citius. Caluaria trigintaquinque diebus glutinatur. Brachium & tibia diebus quadraginta coalescunt. firmatur cubitus diebus circiter triginta. Narium os perfractum decem & octo dierum spatio consolescit. Costa post primum & uigesimalium diem Celso, alijs post octauum & uigesimalium ferrumen implet. ferè etiam intra uigesimalium quartum, & unum & uigesimalium diem sanescunt maxilla; iugulum, scapula, os tali, calx, manus planta. Inter uigesimalium septimum & quadragesimalium humeri & femur. Coxa uerò diebus quinquaginta coalescit Hippocrati. Pes eidein sexaginta dierum spatio, si quiescat, consanescit, & ita de alijs perfracti cuiusq; ossis natura dicendum est. Quin etiam confert ad celerem aut tardam consanationem ægotantis temperatura, ætas, anni tempus & eiusmodi.

X. An id quod intendit chyrurgus possit pericere necne, indicant

**Fracturæ modus.** Nam simplex transversa tolerabilis est, peior ubi fragmenta, atque ubi obliqua, pessima ubi eadem acuta, nam interdum carnem uulnerant, interdum quoque neruum aut musculum.

**Fracturæ complicatio.** Nam quæ cum dolore aut inflammatione, aut carnis contusione accidit mala est.

Item si ossis fracturæ carnis quoque uulnus accesserit in malo etiam æger est, idque maxime si musculi femoris, aut humeri idem senserint. Nam & inflammationes multo grauiores, & ut inquit Celsus promptiores gangrenas habent. adde quod in his fracturis ferulæ applicari non possunt neque fasciæ, licet huius seculi chyrurgi nonnulli contrarium affirmant, contra quos inuenit Hipp. libro de fracturis.

¶. Exigue primus scopus est, ego in sedili collocato manibus ossa retrahere, ut exacta eorum coniunctio fiat, sic ut pristinam unionem imitentur. reliqui scopi huc pertinentes, per subsequentia manifestantur.

Magnæ primus scopus est, ægro respirationato ut uoluit Soranus, uinculis aut instrumento Hippo

1. cratico retrorsum trahere, ut è directo committantur, & interim tu qui præes 6. Meth. manibus corrigere, atque ut in pristinam unionem pars redeat formato.

2. Secundus scopus est posituram seruare, quod assequimur (panniculo oui candido & rosacco imbuto fracturæque adhibito) tuta deligatura; Quæ nec nimis arcta ob dolorem nec nimis laxa, ne ossa commoueantur, esse debet, sed mediocris. Idque sciendum fascia angusta posca madefacta, præcipue in artubus, cuius terminum longitudinis dari non potest, sed pro magnitudine fracturæ, & perfracti membri crassitie utraque dimensio uarianda est. Modus autem deligaturæ ex Hippocrate duabus fasciis fit; primæ fasciæ initium super fracturam iniici debet, ac circa eam bis terue conuolutam sursum uersum ferri, & illic desinere, ut humores fluentes repellat. Altera etiam super fracturam debet incipere, deorsumque tendere, ut humores ex aduerso deprimat, atque iterum reducta in superiore parte, ut maior fiat expulsio, desinere. Quocirca secunda fascia dimidio longior prima esse debet. Deinde ferulæ lana aut stappa mediocriter inuolutæ circumponuntur; Quæ debent esse leuigatæ, planæ, & æquales, & in extremitatibus leniter derasæ & retusæ, in medio uerò, seu supra fracturam ipsam crassæ, & prima deligatura breuiiores; easq; mediocriter superligaminibus adstringito, & membrum apertè reponito ea situs figura, quæ & naturalis sit, & consueta, & a dolore maxime aliena. Cæterum si nulla prurigo, aut inflammatio; aut dolor,


- dolor, aut exulceratio sit, & ossa commissa rectè fuerint, fracturæq; rectè procedat, sic mane re ferulas & ligamenta ad decimum usque diem, uel ad quintum & decimum, uel etiam ad uigesimalum, utile est. Quod si adsit prurigo & dolor non abs re fuerit si tertio quoque die (ut iussit Hipp.) deligationem solueris, & membrum ipsum aqua ten perata pariter dis.
3. Tertijs scopus est pori generatio, quod à Natura fit mediante optimo alimento ad crassum vergente. Carne igitur & uino usque ad decem dies Hipp. præcepto abstinet, post hoc tempus (à quo porus incipit generari) uinum crassum & stipticum audacter concedito, cibumq; paulo pleniotem, quam ab initio fracturæ, laboranti instituito.
4. Quartus scopus est accidentium correctio; Quem unicuique fracturæ compositæ & complicatæ secundum signorum zodiaci seriem subscribemus.
- Y. In fractura cum dolore & inflammatione, deligaturam statim soluit, & lanam, oleum, & acetum congruæque id genus auxilia parti dolenti & inflammatæ admouet, & deligatura aut ferulæ, his permanentibus dandæ non sunt, nisi laxè admodum, ut membrum fulciant, & medicamenta retineant; Quibus remotis, ut prius fracturæ curanda erit.
8. In fractura cum pruritu aquæ temperatæ tantum superinfundere oportet, quantum ad euocandum materiam coniunctam est satis, ut Hipp. Galenq; placuit, & membrum unguento albo, aut populeoneo linendum ut recentioribus placuit chyrurgis.
- xx. In fractura cum conusione carnem affectam, ut gangrenam euites, scarificato.
- xx. In fractura cum gangrena conuenienter occurrat his, quæ in tabulis de tumoribus præter naturam adnotauimus.
88. In fractura cum uulnere, Præsidij in id efficacibus utitor, ut in tabulis de uulneribus descripsimus; Ceterum deligatura talis esto. Orbiculares fasciæ ab utraque uulneris parte iniici debent, oblique uero supra ipsum uulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic ut per de cussim ad x. lites similitudinem, iuxta hiatum oclusio ex omnibus fiat. Et si uulnus lordidum erit, expurgantia medicamenta, quando erit opus, impones. Si purum carnem producentia linteolis illita, adhibebis. Porro ubi purgarum fuerit ulcus, & in eo caro concreuit, non incommodè (quod antea non licebat) ferulæ imponendæ erunt, ut uoluerunt Hipp. Galenus, & Cornelius Celsus. Sicut nec licet ferulas apponere, si fractura magna est, & transfuersalis, aut squammula aliqua ex offe resoluatur. Quod si fractura fuerit secundum longitudinem membri, tunc ex utraq; ulceris parte ferulas in principio curationis circumdare licitum esto. Porro per totum id quo uulnus curatur tempus, medicamen aliquod inflammationem arcens uulneri incumbet, ac simplices fasciæ iniiciantur, quæ singulis curationibus resoluantur, alijs supra dictis remanentibus.
- my. In fractura cum ossis fragmento
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Retuso, in suam sedem dandum                                       | } In suam sedem dandi ma |
| Acutus, acumen eius longius est præcidendū                         |                          |
| Breuior, lauandum & utrinq; limandum                               |                          |
| Maiori & membranulis circumdato, sine ore oportet eum cum medicamē | na aut uulSELLA          |
- tis resolui, idq; os ubi nudatum fuerit, abscondere, quod maturius faciendum est, potestque ea ratione os coire & uulnus sanescere, ut uoluit Celsus lib. 8. cap. 20. Nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut fragmenta quædam ueluti emoriantur, neq; cum cæteris coeant; Quod hoc quoq; ex modo fluentis humoris colligitur, quo tempore magis necessariū est, sepius uulnus soluere, atq; nutrire; sequitur uero ut id os per se post aliquot dies excidat.
- u. In fractura cum superflua ossis humiditate calli generationem impediende minima, aut pluri ma perfusione aquæ curatur. Quippe minima. 6. Meth. cum prius dclstiat quam aliquid con fluat, & qui in superficie sunt humores per halitū digcrit, & qui in alto sunt modice liquat. Plurima uero perfusio plus digerit quam attrahit, atque commodat superfluz humiditati.
- m. In fractura cum ossis nimia siccitate callum generari impediende, tertio uel quarto die expedie aquam calidam infundere, hanc metam perfusionis habentes, cum carnes in tuorem rubrum atolluntur, atque priusquam subidere incipiat, desistendum est.
- z. In fractura cum callo nimium excrecente uel diminuto utrunq; corrigitur perfusionis quan titate, & qualitate, ciborum et medicamentorum, quæ extrinsecus apponuntur, facultate, quæ emplasticā uim habent, cuiusmodi est emplastrū quod ex pice conficit, callos generat & promouet. Quæ uero digerunt callos maiores factos imminuunt, Galeno autore. Paulus uero

uerò laminam plumbeam adhibet compressa ligatura;& a Celso loco citato multa huc spectantia connumerantur,ad quem lectorem mittimus. Verum hæc convenire uideantur callo non inueterato. Nam si in lapideam duritiem euaserit, aperta ibi cute deradendus est, parsque eius eminens scalptis admotis excidenda est.

- b. In fractura male ferruminata,si tener est callus & non ultra sex menses radices egerit frangere rursus, & dirigere eam oportet. Idque hoc modo fit, calida aqua multa, uel decocto aliquo emolliente diebus aliquot membrum fouetur,& medicamento ex dialthea aut alio calsum solvente contegitur. Deinde facta emolliatione a ministris duobus qui in diuersa contendant,intenditur. Et inter hæc chyrurgus ossi pertractans manibus eam diducit,compellitque id quod eminet in suam sedem, atque ita alligando assuescere iterum uultæ sedi (inquit Celsus) cogit. Si ueritas callos occupauit, satis est (Albucasi monitore)manum illi non admouere. Nam in extrema discrimina ægrotantes adducuntur.

Finis.





Quid sit  
agendū  
indicat  
affectus  
naturæ,  
qui sui  
ablationem  
poscit. Idq;  
quatuor  
scopis p  
ficitur.

Curatio in  
qua consi-  
derandum.

An id  
quod in-  
tendit  
chirurgus  
pos-  
sit per-  
ficere  
necne,  
Indicat

1. *Laxati articuli in propriam sedem reductione; quod ut assequaris, luxatum membrum in diuersas partes (leniter tamen, & sine dolore, quatenus licet agendum est) decenter aut manibus, aut habenis, aut machinamento Hippocratico (quod in dicat natura partis luxatæ, & prout nerui, ac tendones valent, & ossa huc illucvè federunt) extendendū est, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os, quod suo loco excidit ab ea parte in qua prolapsum est, in contraria impellere oportet, & ita in germanum suum locum constituere.*

2. *Membrum in suam sedem repositi conseruatione; cōseruabitur autem si rosaceo perlinatur, ac postea pānus lineus gracilis vetus, & lenis rhodino delibutus ipsi applicetur: deinde si stuppe leues, & panni multi plices ouorum candido persufsi super accommodentur, & postmodò fascijs postea madentibus, pro ratione particulæ longis laxisq; superligetur. Quin etiam ferulæ, si necessitas urget, circumdandæ sunt, cauenda tamen vehemētiōr perstricciō, ne inflammatio exciteretur; hisq; ritè apparatis, membrū in sua naturali figura, & à dolore aliena reponendum est, nec ante diem septimum, aut etiam decimū (nullo symptomate superueniente) ipsum soluere oportet, aut alijs medicamentis curare, sed ita sinere. Porro statuto tempore quando resolutur, si aqua calida membrum foueris, nil noxæ attuleris; Nam hi foci dolorē mulcent, & quod in particula defluxit, resoluunt. Vbi membrum ita foueris, mox huic emplastrum ex farina volatili, pulvere rubro communiter appellato, & albo oui in vno corpus reductis, adhibebis. Posthac membrum arctius alligabis Raze auctore.*

3. *Luxati membri à dolore & inflammatione præcautione. Hæc autem deuitabis, si humorum defluxum ad partem affectā fieri prohibebis, idque sit, optima victus ratione, & euacuatione, sanguinis missione, & pharmacia, quæ omnia ad physicum pertinent.*

4. *Accidentium correctio, quod quomodo fiat, ex curatione luxationis compoſitè suis caracteribus signatæ, manifeste apparebit.*

*Morbi & accidentia complicata; Nam, inquit Auicenna. Quibus luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor ingens accedit, hæ præterquam quod curatu sunt difficiles, periculo quoque non vacanti; Adeo ut aliquoties in ijs casibus tutum non sit, luxatæ particulæ reductionem aggredi, sed sic eam remanere (ne pro læsione mors sequatur) melius esse censet.*

*Item luxatio in qua franguntur margines ossium pessima iudicatur.*

*Itē quibuscumq; .6. Aph. 49. & 50. à diuturno coxendicū dolore cōsistat propter mucorū copiam in articulo coaceruatā, suo naturali acetabulo prolapsa excidit, & rursum in patriam suam sedem, aut sponte, aut aliter repulsa est, inibi tamen diu permanere non potest, sed soluta compage lubrica continēter relabitur: his processu temporis tibia & femur necessario alimonie penuria cōtabescit, & omnes in claudicationē euadunt; si ferro ignito non vrantur ut mucus ille absumatur.*

*Temporis diuturnitas: Vetusse enim omnes luxationes, & quæ callo obdurerunt, vel difficillimè, vel nunquam conſaneſcunt.*

*Modus luxationis. Si caput in partem posteriorem prolabitur, nunquam in suo sinu compellitur, sed mortem statim affert inuitabilem; sic neque in spina vertebra, cū toto loco mutata sunt; neque etiam maxilla cum vtraque parte prolapsa est. Nam antequam suo loco reponatur inflammatio concitatur Celſo attestante.*

*Articuli natura. Nam genu, ut facillè prolabitur, ita non magno negotio in suam sedem compellitur; Digitorum etiam luxatio nullum facit negotium, sic de humero (præcipue in macilentibus) intelligendum. Cubitus autē ut difficilè excidit, ita prolapsus magno impendio est; Ægetime enim propter eminentiam tuberculorum sinuumque frequentiam reponitur.*

✚ Luxatio e dolore & inflammatione sic tractatur Celso.lib.8.cap.11. autore, lana succida ex aqua & oleo moderate calido aceti que momento imbuta super impronito. Quod si febris accessit & ossa luxata validis tendonibus retinentur, curiosius hæc faciendæ sunt, & maxime quæ ad uictus rationem, & euacuationem attinent. Cæterum sedato dolore profligataq; inflammatione tentanda est membri reductio, & pleniori uictu utendum, ac sub finem curationis (si res ex sententia cesserit) perfusiones fiendæ ex absinthij decocto, rosarum, musci arboræ, & oxicroceum superponendum, & ad consuetas operationes paulatim redeundum.

☐ Luxatio cum vulnere: Multa diligentia ac prudentia est opus. Dum.n.hæc reponuntur in gens periculum, nonnunquam & mortem immaturam inferunt; Nam cum ex distensione adiacentes partes. s.nerui & musculi inflammantur, dolores ualidi, conuulsiones & febres acutæ suboriuntur, atque hoc præsertim in cubiti gibbero, genu, superioribus etiam articulis. Quanto.n.principalibus membris luxati cum vulnere articuli viciniore sunt, tanto maior tumor est. Sed eo quoq; grauius periculum concitatur, quo maius membrum est, & validioribus neruis continetur; Ideoq; humeri femorique metus mortis est. Hinc Hipp.lib.de luxatorum, fractorumque ossium coaptatione, horum repositionem, ualentio remq; ligaturam aduersatur, solisque inflammationem mitigantibus per initia uti iubet. Sic.n. (inquit) ipsis superesse licebit. Vbi autem inflammatio conqueuerit, quod septem diebus aut nouem cõmuniter sit, præfati etiam periculum apud necessarios ægrotantis, quod ex repositione futurum sit, tum quod si non reponatur, debilem ea parte hominẽ, & claudum fore; conabimur turò, & sine ulla uiolentia os in suam sedem compellere. Porro uulneris curationem eandem, quæ propofita est tabula defracturis cum vulnere administrabimus.

✚ Luxatio cum fractura sic corrigitur, luxatio primum si fieri potest, fractura secundo curanda crit. At si ante fracturam luxatio commodè curari non possit, fracturam primo curabimus, deinde ea callo confirmata, luxationis curationem aggrediemur.

Quod si luxatio inueterauerit, ea decocto maluæ & altheæ perfundenda est, deinde unguento dialtheæ collinenda; post hæc emplastrum diachylon magnum superponendum erit, & loco sub his sufficienter emollito, luxatum in suam sedem dandum est.

Finis.



